

Ma teżisti l-ebda tilqima għall-HCV

L-Epatite C ma tistax tigi trażmessa permezz ta' kuntatt każwali, tgħanniq, bews, sogħla u għatis, jew permezz ta' qsim ta' ikel, ilma jew pożati.

Kura għall-Epatite C

Il-persuni infettati kollha għandhom imorru għal viżti għand tobba speċjalizzati.

Il-kura tinvolvi għadd ta' mediċini varji. Is-suċċess tal-kura jiddependi fuq liema tip ta' vajrus ikollu l-pazjent, u fuq kemm ikun ilu li gie infettat bih.

Il-mediċini antivirali jistgħu jikkawżaw diversi effetti sekondarji bħal dardir, gheja, dipressjoni, uġiġh ta' ras, raxx fil-ġilda u uġiġh fil-ġisem.

Jeħtieġ li jkun hemm moniteragg regolari sabiex il-progress tal-pazjent jiġi vvalutat. Jekk l-infezzjoni tgħaddi, il-pazjent ma jkunx rezistenti għall-Epatite C. In-nisa għandhom jevitaw li jinqabdu tqal waqt il-kura.

L-Epatite C

Għajnuna disponibbli

- Tabib tal-familja (GP)
- Il-Klinika ĠenitoUrinarja (GU clinic) fuq **2122 7981**
- Id-Direttorat għall-Promozzjoni tas-Saħha u l-Prevenzjoni tal-Mard fuq **2326 6000**

www.ehealth.gov.mt

Fittex it-Taqsima tal-Prevenzjoni u l-Kontroll ta' **Mard Infettiv** taht id-drop down menu tas-Saħha **Pubblika**

Informazzjoni miġbura minn **Joanne Farrugia**
Disinn ta' **Stefan Attard**

SAHTEK
għal qalbna

 **Direttorat għall-Promozzjoni
tas-Saħha u Prevenzjoni tal-Mard**
5B, The Emporium, Triq C. De Brocktorff, Msida MSD 1421 Malta.
Tel: 2326 6000, www.ehealth.gov.mt



Ministeru tas-Saħha, l-Anzjani
u Kura fil-Komunità

L-Epatite



© 2012

L-Epatite C (HCV) hija infezzjoni virali li tikkawża infjammazzjoni tal-fwied.

Sinjali u Sintomi tal-Epatite C

- Sintomi qosra u hfief li jixbhu lil dawk tal-influenza
- Dardir u rimettar
- Dijarea
- Nuqqas ta' aptit
- Telf fil-piż
- Suffejra (meta l-abjad tal-għajnejn isir isfar, il-ġilda ssir safra, l-awrina ssir skura u l-ippurgar ikun ta' kulur ċar)
- Hakk fil-ġilda

Madwar 20% tal-persuni infettati jeghlbu l-vajrus fi żmien 6 xhur. Madankollu, dan ma jfissirx li se jibqgħu reżistenti għal infezzjoni mill-ġdid minn dan il-vajrus.

Il-bqija (80%) tal-persuni infettati l-oħra jiżviluppaw infezzjoni kronika tal-Epatite C, li mhux dejjem tikkawża sintomi. Persuni infettati bħal dawn iġorru l-vajrus għall-bqija ta' hajjithom, u b'hekk jibqgħu infettivi u ta' riskju għal haddiehor. Jistgħu jiżviluppaw kumplikazzjonijiet bħal ċirrozi tal-fwied u kanċer tal-fwied.

Perjodu ta' inkubazzjoni: (il-perjodu ta' żmien bejn meta sseħħ l-espożizzjoni għall-vajrus u meta s-sinjali u s-sintomi jibdedu jidhru għall-ewwel darba) minn ġimagħtejn sa sitt ġimghat. Normalment minn 6 ġimghat sa 9 ġimghat.

Testijiet Dijanjostici:

- Testijiet tad-demmm
- Test tal-funzjonament tal-fwied
- Bijopsija tal-fwied

Kif tista' tiġi infettat/a bl-Epatite C?

L-HCV hija infezzjoni li tittieħed permezz tad-demmm

- Tisliġ ta' oġġetti li jintużaw biex tiġi injettata d-droga (labar, mgharef li fihom tissaħħan id-droga u oġġetti oħra li jintużaw għat-tehid tad-droga mill-immieher). Din hija r-rotta primarja tal-infezzjoni
- Jekk tuża xfafar tal-lehja u xkupilji tas-sniien ta' persuni infettati



- Jekk tuża tagħmir tat-tatwaġġi, tal-akupuntura jew tal-body piercing li ma jkunx ġie sterilizzat
- Jekk tiġi espost/a għal xi demm waqt li tkun qed tagħmel sess minghajr protezzjoni xierqa ma' persuna infettata. It-trażmissjoni permezz tas-sess mhuwiex mod komuni kif wieħed jiġi infettat bl-HCV.

- Tingiż aċċidentali bl-labar f'kuntasti ta' kura tas-saħħa
- Ghodda li tintuża fi proċeduri dentali u mediċi li jkun ikkontaminat u li ma jkunux ġew sterilizzat b'mod xieraq
- Rarment minn omm infettata lit-tarbija tagħha waqt it-twelid.



Prevenzjoni

- Tissellifx labar u mgharef li jintużaw għall-użu tad-droga, jew oġġetti li jintużaw għal prattiki ta' tehid ta' droga mill-immieher
- Tissellifx xfafar tal-lehja, xkupilji tas-sniien jew oġġetti personali oħra li jinvolvu kuntatt ma' demm infettat.
- Dejjem uża l-kondoms waqt relazzjonijiet sesswali.
- Mur biss għand hwienet tat-tatwaġġi, tal-akupuntura u tal-body piercing li huma liċenzjati.